


## गर्भावस्था में इन दवाओं का प्रयोग न करें

- अमिकासिन (Amikacin)
- क्लोरोम्फेनिकॉल (Chloramphenicol)
- सिप्रोफ्लॉक्सेसिन (Ciprofloxacin)
- डाइसाइक्लोमीन (Dicyclomine)
- डॉक्सीसाइक्लिन (Doxycycline)
- आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां  
(Emergency contraceptive pill)
- फुराजोलिडोन (Furazolidone)
- जेन्टामाइसिन (Gentamicin)
- ग्रीसीयोफ्लिविन (Griseofulvin)
- हाइड्रॉक्सी यूरिया (Hydroxyurea)
- (Oral contraceptive pills)
- प्राइमाक्वीन (Primaquine)



## नवजात शिशु में इन दवाओं का प्रयोग न करें

- एलबेन्डाजोल (Albendazole)
- क्लोरोम्फेनिकॉल (Chloramphenicol)
- सिप्रोफ्लैक्सेसिन (Ciprofloxacin)
- डॉक्सीसाइक्लिन (Doxycycline)
- लिंडेन लोशन (Lindane lotion)
- प्राइमाक्वीन (Primaquine)



## स्तनपान के दौरान इन दवाओं का प्रयोग न करें

- डायक्लोफेनेक  
(Diclofenac Sodium (with caution))
- डॉक्सीसाइक्लिन (Doxycycline)
- हाइड्रॉक्सी यूरिया (Hydroxyurea)
- गर्भनिरोधक गोलियाँ या ओरल कांट्रासेप्टीव पिल्स  
(Oral contraceptive pills)



## इन दवाओं को खाना खाने से पहले दें

- आयरन (Iron)
- अजिथ्रोमाइसिन (Azithromycin)
- रिफैम्पिसिन (Rifampicin)
- रैनिटिडीन (Ranitidine)
- अम्लरोधी गोली (Antacid Tablet)
- एमॉक्सिसिलीन (Amoxicillin)
- मेटफॉर्मिन (Metformin)

## इन दवाओं को खाना खाने के बाद दें

- कैल्शियम गोली (Calcium Tablet)
- सिप्रोफ्लॉक्सेसिन (Ciprofloxacin)
- डायक्लोफेनेक (Diclofenac)
- हाइड्रॉक्सी यूरिया (Hydroxyurea)
- क्विनाइन सल्फेट (Quinine Sulphate)
- प्राइमाक्वीन (Primaquine)
- डॉक्सीसाइक्लिन (Doxycycline)
- एमिनोफायलिन (Aminophylline)
- क्लोरोक्वीन (Chloroquine)
- इबुप्रोफेन (Ibuprofen)

दवाई का नाम  
संकेत / समयावधि –

– प्रसिपरिन Aspirin (दर्द निवारक और बुखाररोधी या एनालजोसिक और एण्टीपायरेटिक)

1. दर्द के लिए, दिल के बाद दौरे के बाद प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में लेने के लिए 2. बुखार के लिए 3. खून पतला करने के लिए

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						सावधानियाँ	
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.		
वयस्कों में 300–600 मि.ग्रा. (1–2 गोली) प्रतिदिन दिन में चार बार	Tablet (गोली) (300 मि.ग्रा.)	Oral (मुँह द्वारा) ( )	0–6 माह	6 माह – 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	– गम्भीरता और छोटे बच्चों के लिए न दें। – स्तनपान के दौरान सामान्य मात्रा में दी जा सकती है। – दवाई देने से पहले मरीज को पूछें कि उन्हें यकृत की समस्या, दमा, हृदय की समस्या, पेट में छाले, गुर्दे की समस्या, गाहिया, खून की कमी और कोई ओपरेशन करवाने वाले हों, तो डॉक्टरी सलाह लेकर ही दवा दें। – मरीज को बताएं कि इस दवा को भोजन, दृश्य, पर्याप्त पानी के साथ दें और इस दवा को चबाकर न खाएं।
			1/4–	1/2–	1/2–	1/2–	1/2–	1–1–1–1	2–2–2–2	खून की कमी पेट में छाला

दवाई का नाम — डायब्लोफेनेक Diclofenac (दर्द निवारक या एनालजेसिक)  
संकेत / समयावधि — 1. शरीर दर्द में 2. माहवारी के दर्द में 3. गठिया रोग में होने वाला दर्द के लिए

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
3—5.9 कि.ग्रा.	6—9.9 कि.ग्रा.	10—14.9 कि.ग्रा.	15—19.9 कि.ग्रा.	20—29.9 कि.ग्रा.	30—44.9 कि.ग्रा.	45 +				
0—6 माह	6 माह — 1 वर्ष	1—3 वर्ष	4—6 वर्ष	6—10 वर्ष	11—14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा				
Injection (इंजेक्शन)	Intramuscular (IM) प्रतिदिन दो बराबर खुराक में बांटकर	75 मि.ग्रा. /3 मि.ली. एम्पूल 2 मि.ग्रा. / कि. ग्रा. प्रतिदिन 1 बार	0.5 मि.ली. ×	1 मि.ली. प्रि.ली.	1.5 प्रि.ली.	2 मि.ली. 3 मि.ली.	3 मि.ली. 3.5 मि.ली.	सिर दर्द, पेट में ऐठन, कफ्ज़, दरस्त, मितली, चक्कर आना, शरीर पर <sup>1</sup> चकरे, खुजली, ज्यादा मात्रा में दवा लेन पर	— यह दवा गर्भावस्था —मलहम का प्रयोग शिशुओं व बच्चों में, आँखों में, चमड़ी के संक्रमण में, खुले घाव में न करें।	

सूक्ष्मकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	चुराक						सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में						
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 +
		0–6 माह	6 माह – 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष से ज्यादा		दुष्प्रभाव
सूक्ष्मकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 +
	2–3 मि.ग्रा. /कि.ग्रा. दो बारबार चुराक में बांटकर	Eye Drops (आँख में लगाने वाली दवा)	0.1%	x	x	x	1 बूंद दिन में चार बार	1 बूंद दिन में चार बार	1 बूंद दिन में चार बार
		Rectal Suppository (1.25 मि.ग्रा. /कि.ग्रा.)	25 मि.ग्रा. Suppository (5 Suppository)	x	1/2 सपोजिटरी	1 सपोजिटरी	2 सपोजिटरी	2½ सपोजिटरी	— मरीज को बताएं कि गोली को चाबाकर एकत स्त्राव, पेशाब में खुन आ सकते हैं। के बाद दें।
		Topical (मलहम)	3.0%	इस दवा का एक प्रत प्रभावित क्षेत्र पर दिन में दो बार लगाएं					

- दवाई का नाम — आइबुप्रोफेन Ibuprofen (दर्द निवारक या एनालजेसिक)  
 संकेत / समयावधि — 1. गठिया रोग, अकड़न में, 2. सिरदर्द, बुखार, माहवारी के दर्द में 3. मोच, मांसपेशी / हड्डी की चोट में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3—5.9 कि.ग्रा.	6—9.9 कि.ग्रा.	10—14.9 कि.ग्रा.	15—19.9 कि.ग्रा.	20—29.9 कि.ग्रा.	30—44.9 कि. ग्रा.	45 +		
		0—6 माह	6 माह — 1 वर्ष	1—3 वर्ष	4—6 वर्ष	6—10 वर्ष	11—14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		
		Syrup (सिरप) 100 मि.ग्रा. / 5 मि.ली. एम्प्लू	2—2—2 मि.ली.	3—3—3 मि.ली.	4—4—4 मि.ली.				सिर दर्द,, चक्कर, कान में सीटिया बजना, मुँह में छाले आना, अपच, मिली, उल्टी, पीलिया	— गर्भवत्था में यह दवा डॉक्टरी सलाह से ही दें। — दवा देने से पहले मरीज से पूछें कि उन्हें गुर्दे की बीमारी, हृदय रोग, दमा, फेट में घाव, उच्च रक्तचाप और एलर्जी तो नहीं है, उसके बाद डॉक्टरी सलाह से दवा दें।
	<u>वयस्कों में</u> 200—400 मि.ग्रा. दिन में तीन बार। <u>बच्चों में</u> 10 मि.ग्रा. / कि.ग्रा. तीन बराबर खुराक में	Oral (मुँह द्वारा) Tablet (गोली) 200 मि.ग्रा.								— मरीज को बताएं कि यह दवा खाली पेट न लें।
		Tablet (गोली) 400 मि.ग्रा.								

दवाई का नाम — अन्लरोधी गोली Antacid Tablet (अन्लरोधी या एटाएसिड)

संकेत / समयावधि — 1. पेट में छाले, जलन और अपच होने पर, 2. पेट में गैस बनने पर

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ		
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में									
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.				
		0–6 माह	6 माह	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा				
		Syrup (सिरप) (625 मि.ग्रा. मैग्निशियम ट्राइसिलिकेट + 312 मि.ग्रा. एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड) /5 मि.ली.								- मरीज को बताएँ कि इस दवा को खाना खाने के पहले लें और गोली को अच्छी तरह चुसकर लें, उसके बाद एक गिलास पानी पीएँ। -		
		वयस्कों में 500–1000 मि.ग्रा. प्रतिदिन जब आपश्यक हो तब बच्चों में 150–300 मि.ग्रा. प्रतिदिन जब आपश्यक हो तब							1 से 2 गोली	यदि सिरप का इस्तेमाल करें तो पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएँ, फिर दवा लें।		
		Oral (मुँह द्वारा) Tablet (गोली) 500 मि.ग्रा. मैग्निशियम ट्राइसिलिकेट + 250 मि.ग्रा. एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड										

दवाई का नाम – सिट्रीजीन Cetirizine (एलजीरोधी या एटीएलजिक)  
 संकेत / समयावधि – 1. एलजी के उपचार में, 2. सामान्य सर्दी में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध फूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + वर्ष	
			0–6 माह	6 माह – 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
<u>वयस्क</u> 5–10मि.ग्र. प्रतिदिन दिन में एक बार	<u>बुजुगी में</u> 5 मि.ग्र. प्रतिदिन	Syrup (सिरप) (5 मि.ग्र./5 मि.ली.)	x	x	2.5 मि.ली.	4 मि.ली.	x	x	x	– शुरुआती गम्भीरता और स्तनपान के दौरान इस दवा का उपयोग न करें।
		Oral (मुँह द्वारा)								– मरीज को इस दवा को खाने के बाद जोखिम भरे कार्य न करें। – दवा लेने के दौरान शराब का सेवन न करें।
		Tablet (गोली) (150 मि. ग्रा.)	x	x	1/4	1/4	1/2	3/4	1	

दवाई का नाम — डेक्सामेथासोन Dexamethasone (एलजिक या एलजीरोधी)  
 संकेत / समयावधि — 1. त्वचा की एलजिक गडबडियों में, 2. दमा के उपचार में, 3. जोड़ों के दर्द व अकड़न के उपचार में, 4. गंभीर स्थितियों में

		खुराक									
		वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में									
सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	3—5.9 कि.ग्रा.	6—9.9 कि.ग्रा.	10—14.9 कि.ग्रा.	15—19.9 कि.ग्रा.	20—29.9 कि.ग्रा.	30—44. कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.	विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			0—6 माह	6 माह — 1 वर्ष	1—3 वर्ष	4—6 वर्ष	6—10 वर्ष	11—14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		— यह दवा गर्भावश्चा में डॉक्टरी सलाह से ही दें।
वयस्क / बच्चे 0.4—0.8 मि. ग्रा. दिन में दो बार दें।	Oral (मुँह द्वारा)	Tablet (गोली) 0.5 मि. ग्रा.	1 / 4—1 / 4	1 / 2—1 / 2	1—1	1½—1½	2—2	x	x	माहवारी में अनियमितता, हृदय की अनियमित धड़कन	— पैटिक अल्सर (पेट में छाले), टी. बी., मानसिक रोग वाले मरीज को यह दवा न दें।
		Tablet (गोली)	x	x	1 / 4—1 / 4	1 / 2—1 / 2	3 / 4—3 / 4	1—1	1—1		

दवाई का नाम — प्रेडिनसोलोन Prednisolone (एण्टी एलर्जिक या एलर्जी रोधी )

संकेत / समयावधि — 1. सूजन व चमड़ी की एलर्जिक गड़बड़ियों में, 2. जिगर, आहार नाल व गुदों की गड़बड़ियों के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	चुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + वजन से ज्यादा	
			0–6 माह —	6 माह – 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से	
वयस्कों में 5–60 मि.ग्रा. प्रतिदिन	Oral (मुँह द्वारा)	Syrup (सिरप) 5 मि.ग्रा. /5 मि.ली.	2.5–2.5– 2.5–2.5 मि.ग्रा.	5–5–5–5 मि.ली.						- शिशु व बच्चों में दवा का उपयोग सावधानीपूर्वक करें।
1–3 बराबर चुराक में बांटकर दें।	Tablet (गोली) 10 मि.ग्रा.	1/4– 1/4– 1/4– 1/4	1/2– 1/2– 1/2– 1/2	3/4– 3/4– 3/4– 3/4	3/4– 3/4– 3/4– 3/4	1–1– 1–1 1–1	1–1– 1–1 1–1	1 1/4– 1 1/4– 1 1/4– 1 1/4	2–2– 2–2	- इस दवा को 1 सप्ताह से अधिक चिकित्सकीय निगरानी में हो दें।

दवाई का नाम — अमिकासिन Amikacin (प्रतिजोविक या एंटीबॉयलिक)  
संकेत / सम्यावधि — 1. गंभीर संक्रमण के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + वर्ष	
			0–6 माह 1 वर्ष	6 माह – 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
<u>वयस्क</u>										— गम्भीरवस्था में न दें।
250–750 मि.ग्रा. प्रतिदिन दिन में एक बार बच्चों में 15–20 मि. ग्रा./कि.ग्रा. दिन में एक बार	Injection (इंजेक्शन) Intravenous (IV)	500 मि.ग्रा. /2 मि.ली. वायल	0.4 मि.ली.	0.5 मि.ली.	0.8 मि.ली.	1 मि.ली.	1.5 मि.ली.	2 मि.ली.	3 मि.ली.	गुर्दे की परेशानी — स्तनपान के दौरान डॉक्टरी सलाह से उपयोग करें।

दवाई का नाम – एमॉक्सिसिलीन Amikacin (प्रतिजेविक या एण्टीबॉयोटिक)  
 संकेत / समयावधि – 1. नाफ़, कान, गले एवं सौँस मार्ग के संक्रमण में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + वर्ष	
			0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
वयस्कों में 50–500 मि. ग्रा. दिन में तीन बार देना है	Oral (मुँह द्वारा)	Tablet (गोली) 125 मि.ग्रा. पानी में छुलने वाली गोली								- यदि दवाई से दरस्त हो तो दवाई बंद करनी चाहिए।
बच्चों में 20–40 मि. ग्रा. दिन में तीन बार देना है	Capsule (केप्सूल) 500 मि.ग्रा.									दरस्त

दवाई का नाम — अजिथ्रोमाइसिन Azithromycin (प्रतिजेविक या एन्टीबॉयोटिक)

संकेत / समयावधि — 1. इवास नली के संक्रमण के उपचार में, 2. कान के संक्रमण में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 +	
			0–6 माह	6 माह— 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
<u>वयस्क</u> 250–500 मि.ग्रा. प्रतिदिन दिन में एक बार 4 दिन तक <u>बच्चों में</u> 10 मि.ग्रा. /कि.ग्रा. प्रतिदिन दिन में एक बार 4 दिन तक	Oral (मुँह द्वारा)	Syrup (सिरप) (200 मि.ग्रा./5 मि.ली.)	1 मि.ली.	1 मि.ली.	3 मि.ली.	4 मि.ली.	×	×	×	— यदि व्यक्ति को दवा से एलर्जी हो तो दवाई न दें। — मरीज को बताएं कि इस दवा को खाना खाने के पहले पर्याप्त पानी के साथ लें। —दवा की खुराक पूरी लैं बीच में छोड़ नहीं।
		Tablet (गोली) 250 मि.ग्रा.	1/4	1/4	1/2	3/4	1	1½	2	
		Tablet (गोली) 500 मि.ग्रा.	×	×	1/4	1/4	1/2	3/4	1	
		Injection (इंजेक्शन)	500 मि.ग्रा. का वायरल 4.6 मि. ली. में स्टेराइल पानी में घाल बनाएँ (500 मि. ग्रा./मि.ली.)							
		Intravenous Intravenous ous (IV) (नस में)	0.5 मि.ली.	1 मि.ली.	1.5 मि.ली.	2 मि.ली.	2.5 मि.ली.	4 मि.ली.	5 मि.ली.	

दवाई का नाम – सिफिक्सीम Cefixime (प्रतिजोविक या एण्टीबॉयलिक)  
 संकेत / समयावधि – 1. मूत्रीय तंत्र, खूनी दर्द के संक्रमण के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में						
		3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.	विशेष दुष्प्रभाव
		0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
<u>वयस्कों में</u> 200–400 मि.ग्रा. प्रतिदिन दिन में एक बार	Syrup (सिरप) 50 मि.ग्रा./5 मि.ली.	2 मि.ली. (दिन में चार बार)	3.3 मि.ली. (दिन में चार बार)	x	x	x	x	x	
<u>बच्चों में</u> (6 माह से ऊपर) 8 मि. ग्रा./कि.ग्रा. प्रतिदिन दिन में एक बार	Oral (मुँह द्वारा)  Tablet (गोली) 200 मि.ग्रा.	1/4	1/2	3/4	1	1½	2		

दवाई का नाम – सिप्रोफ्लॉक्सासिन Ciprofloxacin (प्रतिजेविक या एटीबीयोटिक)  
 संकेत / समयावधि – 1. मूत्र मार्ग, कान पाचन तंत्र के संक्रमण के उपचार में, 2. आंतरिक ज्वर और क्षय रोग के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में			45 +	45 –	45 से ज्यादा		
मिं.ग्रा. प्रतिदिन प्रत्येक 12 घण्टे में बच्चों में 15–20 मि. ग्रा./किं.ग्रा. दो खुराक में	खुराक	उपलब्ध रूप 3–5.9 किं.ग्रा. 0–6 माह 6 माह– 1 वर्ष	3–9.9 किं.ग्रा. 1–3 वर्ष	10–14.9 किं.ग्रा. 4–6 वर्ष	15–19.9 किं.ग्रा. 6–10 वर्ष	20–29.9 किं.ग्रा. वर्ष	30–44.9 किं.ग्रा. वर्ष	45 +		– इस दवा का प्रयोग गर्भावरथा एवं बच्चों के लिए सावधानीपूर्वक करें।
मिं.ग्रा. प्रतिदिन प्रत्येक 12 घण्टे में बच्चों में 15–20 मि. ग्रा./किं.ग्रा. दो खुराक में	खुराक	उपलब्ध रूप 250–750 मि.ग्रा.	Tablet (गोली) 100 मि.ग्रा.	×	×	2–2	3–3	×		– इस दवा का प्रयोग गर्भावरथा एवं बच्चों के लिए सावधानीपूर्वक करें।
मिं.ग्रा. प्रतिदिन प्रत्येक 12 घण्टे में बच्चों में 15–20 मि. ग्रा./किं.ग्रा. दो खुराक में	खुराक	उपलब्ध रूप Oral 250 मि.ग्रा.	Tablet (गोली) 250 मि.ग्रा.	×	×					– इस दवा को गुर्दे की समस्या, निर्णी की बीमारी वाले रोगियों को न दें।
मिं.ग्रा. प्रतिदिन प्रत्येक 12 घण्टे में बच्चों में 15–20 मि. ग्रा./किं.ग्रा. दो खुराक में	खुराक	उपलब्ध रूप 500 मि.ग्रा.	Tablet (गोली) 500 मि.ग्रा.	×	×					– मरीज को बताएँ कि यह दवा खाली पेट (भोजन से एक घंटा पहले या भोजन करने के दो घंटे बाद) लें।

दवाई का नाम — को-ट्राइमॉक्साजोल Cotrimoxazol (प्रतिजेविक या एण्टीबॉयडिक)

संकेत / समयावधि — 1. मूत्र मार्ग के संक्रमण में, 2. सांस एवं कान के संक्रमण में, 3. घाव व चमड़ी के संक्रमण में, 4. खूनी पेचिश में, 5. HIV में

सूचीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3—5.9 कि.ग्रा.	6—9.9 कि.ग्रा.	10—14.9 कि.ग्रा.	15—19.9 कि.ग्रा.	20—29.9 कि.ग्रा.	30—44.9 कि.ग्रा.	45 +		
		0—6 माह	6 माह— 1 वर्ष	1—3 वर्ष	4—6 वर्ष	6—10 वर्ष	11—14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		
वयस्क	800 मि. .ग्रा. सल्फामिथॉक्साजोल (SMX) और 160 मि.ग्रा. ट्राइमेथाप्रिम (TMP) प्रति 12 घण्टे में 7 से 10 दिनों तक दे। बच्चों में 25 मि.ग्रा./कि.ग्रा. सल्फामिथॉक्साजोल (SMX) और 5 मि. ग्रा./कि.ग्रा. ट्राइमेथाप्रिम (TMP) प्रति 12 घण्टे में 7 से 10 दिनों तक दे।	Syrup (सिरप) (200 मि.ग्रा. SMX + 40 मि. ग्रा. TMP)/5 मि.ली.	1.5—1.5 (मि.ली.)	2.5—2.5 (मि.ली.)	5.5 (मि.ली.)	×	×	×	कम्भी—कभी मिचली, उल्टी, चमड़ी पर गंभीर प्रतिक्रिया	— गंभीरता में यह दवा न दें।
		Oral (मुह द्वारा)	Tablet (गोली) (400 मि.ग्रा. SMX + 80 मि. ग्रा. TMP)	1/4— 1/4	1/2— 1/2	1—1	1½— 1½	2—2	2—2	
		Intravenous (नस में)	Injection (इंजेक्शन)	1.6 मि.ली. ++ 80 मि.ग्रा. TMP)/5 मि. ली.	2.6 मि.ली.	4 मि.ली.	8 मि.ली.	12 मि.ली.	15 मि.ली.	

दवाई का नाम — डॉक्सीसाइनिलन Doxycycline (प्रतिजोविक या एण्टीबॉयलोटिक)

संकेत / समयावधि — 1. प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन के उपचार के लिए, 2. मुहासों में, 3. विभिन्न प्रकार के वयरकों संक्रमणों जैसे – निमोनिया इत्यादि में।

सूचीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
3—5.9 कि.ग्रा.	6—9.9 कि.ग्रा.	10—14.9 कि.ग्रा.	15—19.9 कि.ग्रा.	20—29.9 कि.ग्रा.	30—44.9 कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.				— गर्भावस्था,
0—6 माह	6 माह— 1 वर्ष	1—3 वर्ष	4—6 वर्ष	6—10 वर्ष	11—14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा				— दौरान और 7 वर्ष से छोटे बच्चे को न दें।
Capsule (फेस्यूल) 100 मि.ग्रा.	x	x	x	x	x	x				— मरीज को यदि एलर्जी, जिमर एवं गुर्दे की बीमारी हो तो यह दवा न दें।
वयरकों में 200 मि.ग्रा. प्रतिदिन दो बार बाबर खुराक में बांटकर	Oral (मुँह द्वारा)									— मरीज को बताएँ कि यह दवा खाना खाने के बाद और हर खुराक को पूरे एक गिलास पानी के साथ लें एवं शराब का सेवन दरवाई के साथ न करें।
		Tablet (गोली) 50 मि.ग्रा.	x	x	x	x	1.1	1.1	2.2	2.2

- दवाई का नाम — जेन्टामाइसिन Gentamycin (प्रतिजैविक या एण्टीबॉयोटिक)  
 संकेत / समयावधि — 1. मैनिजाइटिस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संक्रमण में, 2. गुर्दे एवं प्रोस्टेट ग्रांडि के संक्रमण में, 3. आँखों के लालपन, आँख एवं कान में दर्द एवं सूजन के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	छुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3-5.9 किं.ग्रा.	6-9.9 किं.ग्रा.	10-14.9 किं.ग्रा.	15-19.9 किं.ग्रा.	20-29.9 किं.ग्रा.	30-44.9 किं.ग्रा.	45 +	
			0-6 माह	6 माह-	1-3 वर्ष	4-6 वर्ष	6-10 वर्ष	11-14 वर्ष	14 वर्ष से ऊपरा	
<u>वयस्क</u>	Injection (इंजेक्शन) Intravenous (IV) (नस में) 2-5 मि.ग्रा./कि. ग्रा. प्रत्येक 8 घण्टे में	80 मि.ग्रा. /2 मि. ली. एम्पूल मि.ली.	0.5 1 मि.ली. एम्पूल	1 मि.ली. मि.ली.	2 मि.ली. मि.ली.	3 मि.ली. मि.ली.	4 मि.ली. मि.ली.	5 मि.ली. मि.ली.	6 मि.ली. मि.ली.	— गुर्दे एवं डिगर के कामकाज में गड़बड़ी, छून की कमी, लकवा, चवकर, कान में गड़गड़ाहट, आलस, सांस लेने में परेशानी, फुसियाँ, थरथराहट, मांसपेशी का फड़कना।
<u>बच्चों में</u>	(0 से तीन सप्ताह उम्र) 3 मि.ग्रा. /कि.ग्रा. प्रत्येक 12 घण्टे में (4 सप्ताह से 12 वर्ष तक) 2 मि.ग्रा. /कि.ग्रा. प्रत्येक 8 घण्टे में	Eye Drops (आँख में डालने वाला दवा)	x	x	1 बूंद दिन में तीन बार	2 बूंद दिन में तीन बार	2 बूंद दिन में तीन बार	2 बूंद दिन में तीन बार	— यह दवा लगातार 10 दिन से ज्यादा न दें।	

दवाई का नाम – मेटफॉर्मिन Metformin (मधुमेहरोधी या एंटी डायबिटिक)  
संकेत / समयावधि – 1. मधुमेह (शरकरा की बीमारी) के नियंत्रण में

सूक्ष्मीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.		
	0–6 माह	6 माह–1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा			
		Tablet (गोली) (500 मि.ग्रा.)	x	x	x	x	1/2–1			
<u>वरप्रक</u>	<u>500–2500 मि.ग्रा. दिन में दो–तीन बार भोजन के साथ</u>	Oral (मुँह द्वारा)								
		Tablet (गोली) (850 मि.ग्रा.)	x	x	x	x	1/2–1			

दवाई का नाम — मेट्रोनिडाजूल Metronidazole (दस्तरोधी या एन्टीबायरियल)

संकेत / समयावधि — 1. पेचिस के उपचार में, 2. योनि, पेट और मसूड़ों के कुछ संक्रमण के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	युगक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3—5.9 कि.ग्रा.	6—9.9 कि.ग्रा.	10—14.9 कि.ग्रा.	15—19.9 कि.ग्रा.	20—29.9 कि.ग्रा.	30—44.9 कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.		
		0—6 माह	6 माह—1 वर्ष	1—3 वर्ष	4—6 वर्ष	6—10 वर्ष	11—14 वर्ष	14 वर्ष से ऊपरा		
<u>वयस्क</u> 500—600 मि.ग्रा. प्रत्येक 8 घण्टे में 5 से 10 दिनों तक दें।		Syrup (सिरप) (200 मि.ग्रा. / 5 मि.ली.)	1—1—1 (मि.ली.)	1.5— (मि.ली.)	2.5— 2.5— (मि.ली.)	3.5— 3.5— 3.5 (मि.ली.)				
<u>बच्चों में</u> 7.5 मि.ग्रा./कि. ग्रा. प्रत्येक 8 घण्टे में 5 से 10 दिनों तक दें।		Oral (मुह द्वारा) Tablet (गोली) (200 मि.ग्रा.)		1/4— 1/4— 1/4	1/2— 1/2— 1/2	3/4— 3/4— 3/4	1—1—1			
		Tablet (गोली) (400 मि.ग्रा.)								
		Intraveno ने (IV) (नस में) 500 मि. ग्रा./100 मि.ली.								
		Infusion (इन्फ्यूजन) नस में देने वाला घोल								

दवाई का नाम – कार्बमेजेपाइन Carbamazepine (मिग्रीधी या एटीइपिलेप्टिक)  
 संकेत / समयावधि – 1. मिग्री के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.		
		0–6 माह	6 माह–1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		
<u>वयस्क</u> 100–200 मि.ग्रा. दिन में दो बार	Syrup (सिरप) (100 मि.ग्रा. / 5 मि.ली.)	2.5–2.5 मि.ली.	4–4 मि.ली.	×	×	×	×	×		– यह दवा गर्भवस्था, स्तनपान के दौरान, शिशु व बच्चे एवं बुजु़गों को न दें।
	Capsule (कैप्सूल) (300 मि.ग्रा.)	×	×	×	×	×	×	1–1	1–1	– जिगर, हृदय, गुर्दे की समस्या वाले मरीजों को यह दवा न दें।
<u>बच्चों में</u> 10–20 मि.ग्रा. /कि.ग्रा. दिन में दो बार	Oral (मुँह द्वारा) Tablet (गोली) (200 मि.ग्रा.)		1/4– 1/4	1/2– 1/2	3/4– 3/4	1–1	2–2			– मरीज को बताएँ कि दवा को भोजन के साथ ले। दवा लेने के बाद जोखिम वाले काम न करें और शराब न पीएँ।
	Tablet (गोली) (400 मि.ग्रा.)		×	×	1/4– 1/4	1/2– 1/2	1–1			

दवाई का नाम – फेनिटोइन Phenytoin (मिग्रीरोधी या एण्टी इपिलेक्टिक)  
संकेत / समयावधि – 1. मिर्गी के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3–5.9 किं.ग्रा.	6–9.9 किं.ग्रा.	10–14.9 किं.ग्रा.	15–19.9 किं.ग्रा.	20–29.9 किं.ग्रा.	30–44.9 किं.ग्रा.	45 + वर्ष		
		0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		
<u>वयरक्त और बच्चे</u> 15–18 मि.ग्रा. /किं.ग्रा.	Oral (मुँह द्वारा) Tablet (गोली) (100 मि.ग्रा.)	x	1/2	3/4	1	2	2½	3	अम, चयकर, नींद न आना, दौरे मितली, अत्यधिक खुराक से मसूड़ों का फूलना	— मरीज को बताएं कि इस दवा को भोजन के साथ में दाँतों को अच्छी तरह साफ रखें। — इस दवा को मांसपेशी (IM) द्वारा न दें।
<u>रोजाना खुराक</u> 5–8 मि.ग्रा. /किं.ग्रा. प्रतिदिन रात में सोते समय	Injection (इंजेक्शन) Intravenous (IV) (नस में) 15 मि. ग्रा./किं.ग्रा. प्रतिदिन								12 मि.ली.	14 मि.ली.
									7.5 मि.ली.	
									6 मि.ली.	
									1.5 मि.ली.	
									2.5 मि.ली.	
									4 मि.ली.	
									200 मि.ग्रा. /2 मि.ली. एम्पूल	

दवाई का नाम — क्लोट्रिमाजोल क्रीम Clotrimazole (फॉक्टूरोधी या एंटीफंगल)  
संकेत / समयावधि — 1. ज़ाँघों में दाद और खुजली होने पर. 2. चमड़ी में दाद होने पर (28 दिनों तक). 3. योनि संक्रमण के उपचार में (7–14 दिनों तक)

सूत्रीकरण	दवाई देने का पार्श्व	उपलब्ध रूप	खुराक	विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
Topical (मलहम) त्वचा में	1% का 15 ग्रा. मलहम	इस दवा को दिन में दो बार चमड़ी के ऊपर तेल जैसा लेप लगाना चाहिए, 28 दिन के लिए		- क्रीम लगाने वाले जगह में साखुन का उपयोग क्रम से क्रम करना चाहिए। - अत्यंत खुजली होने पर सी.पी.एम. गोली भी देनी चाहिए।	
Intravaginal (योनि के अंदर डालने वाला)	1% का 15 ग्रा. मलहम	इस मलहम को योनि के अंदर प्रतिदिन दिन में दो बार लगाएं	कभी-कभी क्रीम लगाने की जगह पर जलन		
Pessary (योनि से देने वाला गोली)	(योनि से देने वाला गोली) 500 मि.ग्रा.	इस गोली को प्रतिदिन एक गोली रात में सोते समय योनि के अंदर तक डालें			

दवाई का नाम — पर्युक्तोनाजोल Flucconazole (फफूंदरोधी या एण्टीफंगल)  
संकेत / समयावधि — 1. फफूंद संक्रमण के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3–5.9 किं.ग्रा.	6–9.9 किं.ग्रा.	10–14.9 किं.ग्रा.	15–19.9 किं.ग्रा.	20–29.9 किं.ग्रा.	30–44.9 किं.ग्रा.	45 +		
		0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		
<u>वयस्क</u> 150–400 मि.ग्रा. प्रतिदिन दिन में एक बार <u>बच्चों में</u> 3–6 मि.ग्रा. /किं.ग्रा. दिन में एक बार	Oral (मुँह द्वारा)	Tablet (गोली) (150 मि.ग्रा.)	×	×	1/2	3/4	1	1½	2	— गर्भावस्था में यह दवा लॉकटरी सलाह से ही दें।
		Tablet (गोली) (200 मि.ग्रा.)	×	×	1/2	1/2	3/4	1	1½	— स्तनपान के दौरान व जिगर की बढ़ी हुई बीमारी में यह दवा न दें।
	Injection (इंजेक्शन)	200 मि.ग्रा. /100 मि. ली. (नस में देने वाला घोल)								खून में गड़बड़ी, जिगर के काम में गड़बड़ियाँ
	Intravenous (IV)	(नस में)								
			40 मि.ली.	55 मि.ली.	75 मि.ली.	100 मि.ली.	150 मि.ली.			

दवाई का नाम — एलबेन्डाजोल Albendazole (कृमिनाशी या एटी हेमोन्टिक्स)

संकेत / समयावधि — 1. कृमियों को नष्ट करने के लिए, 2. जब व्यक्ति के शरीर में खुन की कमी हो और डॉक्टरी जाँच में दूसरा कोई कारण न हो तब

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3–5.9 किमि.ग्रा.	6–9.9 किमि.ग्रा.	10–14.9 किमि.ग्रा.	15–19.9 किमि.ग्रा.	20–29.9 किमि.ग्रा.	30–44.9 किमि.ग्रा.	45 + किमि.ग्रा.		
		0–6 माह	6 माह–1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		
वयस्क / बच्चे	Oral	Syrup (सिरप) (200मि.ग्रा. / 5 मि.ली.)	x	x	x	10 मि.ली.	x	x	कम्भी–कभा इ चमड़ी पर लाल चकते दिखाई देना, दस्त, एक लाख में से एक बच्चे को झटके आ सकते हैं।	— गम्भीरता के दौरान न दें।
400 मि.ग्रा. दिन में एक बार	(मुँह द्वारा)	Tablet (गोली) (400 मि.ग्रा.)	x	x	x	1	1	1	— 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को न दें।	— मरीज को समझाएँ कि गोली को चबाकर खाएँ।

दवाई का नाम – एमलोडिपीन Amlodipine (उच्च रक्तचापरोधी या एण्टी हाइपरटेंसिव)  
 संकेत / समयावधि – 1. उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में						
		3–5.9 किं.ग्रा.	6–9.9 किं.ग्रा.	10–14.9 किं.ग्रा.	15–19.9 किं.ग्रा.	20–29.9 किं.ग्रा.	30–44.9 किं.ग्रा.	45 + वर्ष से ज्यादा	विशेष दुष्प्रभाव
		0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष		
<u>वयस्क</u>	2.5–10 मि.ग्रा. प्रतिदिन दिन में एक बार	Oral (मुँह द्वारा) (5 मि.ग्रा.)	Tablet (गोली) (5 मि.ग्रा.)	x	x	x	1/2– 1½	1/2 – 2	– यह दवा गम्भीरता, रक्तचाप कम होने पर, हृदय की नाकामी और हृदय रोगियों को हृदय रोगियों को न दें। – मरीज को बताएं कि दवा नियमित रूप से लें।

दवाई का नाम – एनाप्रिल Enalapril (उच्च रक्तचापरोधी या एण्टी हाइपरटेन्सिव)  
 संकेत / समयावधि – 1. उच्च रक्तचाप (बी.पी.) के नियंत्रण में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुगक						सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में						
		3–5.9 किं.ग्रा.	6–9.9 किं.ग्रा.	10–14.9 किं.ग्रा.	15–19.9 किं.ग्रा.	20–29.9 किं.ग्रा.	30–44.9 किं.ग्रा.	45 +	विशेष दुष्प्रभाव
		0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
वयस्क	25–50 वर्ष	Tablet (गोली) (10 मि.ग्रा.)	x	x	x	1/4	1/4	1/2	- यह दवा गर्भावस्था, गुर्दे की बीमारी के लिए उपयोग न करें। - जो व्यक्ति शराब और तंबाकू लेते हैं उन्हें यह दवा न दें। - ऐसे मरीज जिनका रक्तचाप कम हो उन्हें यह दवा न दें। - रसनपान के दौरान सावधानीपूर्वक उपयोग करें। - दवा देने से पहले व बाद में मरीज का अवश्य मापें।
	51–60 वर्ष	Oral (मुँह द्वारा)							
	61–70 वर्ष	Tablet (गोली) (5 मि.ग्रा.)	x	x	x	1/2	1/2	1	

दवाई का नाम — हाइड्रोक्लोरथाजाइड Hydrochlorothiazide (उच्च रक्तचापरोधी या एप्टी हाइपरटेन्सिव)

संकेत / समयावधि — 1. उच्च रक्तचाप (बी.पी.) के नियंत्रण में, 2. मूत्रवर्धक, शरीर में तरल पदार्थों के संग्रहण को घटाने में

सूक्ष्मीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में			विशेष दुष्प्रभाव			
3–5.9 कि.ग्रा.	3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.		— गर्भावस्था, रक्तनपान के दौरान न दें।
0–6 माह	0–6 माह— 1 वर्ष	6 माह— 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		— यह दवा गुर्दे व जिगर संबंधी बीमारियों गठिया, शक्कर की बीमारी वाले रोगियों को न दें।
Tablet (गोली) (25 मि.ग्रा.)									— ऐसे मरीज जिनका रक्तचाप कम हो, उन्हें यह दवा न दें।
वरस्क 12.5–25–100 मि.ग्रा. प्रतिदिन दिन में एक बार	Oral (मुँह द्वारा)								— दवा देने से पहले व बाद में मरीज का रक्तचाप (बी.पी.) अवश्य मापें।
	Tablet (गोली) (50 मि.ग्रा.)								— मरीज को बताएं कि दवा भोजन या दूध के साथ लें और दवा लेने के दौरान शराब का सेवन न करें।
									— इस दवा को लेने से बार-बार पेशाब हो सकता है।

- दवाई का नाम – मिथाइलडोपा Methylldopa (उच्च रक्तचापरोधी या एण्टी हाइपरटेन्सिव)  
 संकेत / समयावधि – 1. गंभीर रक्तचाप के नियंत्रण के लिए (गम्भीरता में बी.पी. अधिक होने पर दे)

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुएक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 +	
			0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
वयस्क	125–500 मि.ग्रा. (10 मि.ग्रा. / कि. ग्रा.) प्रतिदिन दिन में एक बार	Oral (मुँह द्वारा) Tablet (गोली) (250 मि.ग्रा.)		x	x	x	1	1½	2	- गम्भीरता में जरूरत होने पर ही इस्तेमाल करें और कम से कम मात्रा में दें।
										- स्तनपान के दौरान सावधानियाँ रखें। - यदि मरीज को जिगर की समस्या, खून की कमी एवं गुर्द की कोई समस्या हो तो डॉक्टरी सलाह लेकर ही दवा लें। - यह दवा ऐसे खाने के बाद दें जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो। दवा देने से पहले व बाद में बी.पी. की अवश्यक जाँचें। - मरीज को बताएँ कि दवा नियमित रूप से लें।

दवाई का नाम – आरटीसुनेट Artesunate (मलेरियारोधी या एटी मलेरियल)  
संकेत / समयावधि – 1. मलेरिया के उपचार में, 2. मरित्स्क मलेरिया के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	चुराक						सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में						
3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14. 9 कि. ग्रा.	15–19. 9 कि. ग्रा.	20–29. 9 कि. ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 +	विशेष दृष्टिभाव		
0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा			
				शुरुआत चुराक					
Injection (इंजेक्शन)	60 मि.ग्रा. वायल को 1 मि.ली. सोजा बाइ कार्बोनेट में घोलें और 2 मि.ली. स्टेराइल (मांसपेशी में) प्रत्येक 24 घण्टे में	0.6 मि.ग्रा.	1 मि.ग्रा.	1.5 मि.ग्रा.	2 मि.ग्रा.	3 मि.ग्रा.	4 मि.ग्रा.	6 मि.ग्रा.	
						रोजाना चुराक			
पहले दिन 100 मि.ग्रा. दिन में दो बार और अगले चार दिन तक 50 मि.ग्रा. दिन में दो बार	0.3 मि.ग्रा.	0.5 मि.ग्रा.	0.75 मि.ग्रा.	1 मि.ग्रा.	1.5 मि.ग्रा.	2.3 मि.ग्रा.	3 मि.ग्रा.		

सूक्षीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	चुराक						सावधानियाँ	
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14. 9 कि.ग्रा.	15–19. 9 कि.ग्रा.	20–29. 9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + दुष्प्रभाव	
			0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
<u>बच्चों में</u>			शुरुआत चुराक							
पहले दिन 2.5 मि.ग्रा./कि.ग्रा. दिन में दो बार और अगले चार दिन तक 1.25 मि.ग्रा./कि.ग्रा. प्रतिदिन दो बार			Injection (इंजेक्शन)	60 मि.ग्रा. वायरल को 1 मिली. सोडा बाइ कार्बनेट में घोलें और 2 मिली.	1.2 मि.ग्रा.	2 मि.ग्रा.	3 मि.ग्रा.	4 मि.ग्रा.	6 मि.ग्रा.	9 मि.ग्रा.
			Intravenous (IV)	(नस में) प्रत्येक 24 घण्टे में स्ट्रेशइल पानी में घोलें (60 मि.ग्रा. /6 मिली.)	0.6 मि.ग्रा.	1 मि.ग्रा.	1.5 मि.ग्रा.	2 मि.ग्रा.	3 मि.ग्रा.	4.5 मि.ग्रा.
				शुरुआत चुराक						6 मि.ग्रा.
			Tablet (गोली) (25 मि.ग्रा.)	x	x	x	x	1	2	3
			Tablet (गोली) (50 मि.ग्रा.)	x	x	x	x	3/4	1	1½

दवाई का नाम — पैरासिटामोल Paracetamol (ज्वरनाशक [बुखारसोधी] और दर्द निवारक या एटीपाथरेटिक)

संकेत / समयावधि — 1. बुखार, सर्दी एवं खाँसी के ज्वर में, 2. सिरदर्द एवं शारीरिक दर्द में

सूचीकरण	दवाई का नाम	देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक				विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
				वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में					
	3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.		
	0–6 माह	6 माह–1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		
वयस्क	Oral (मुँह द्वारा) 0.5–1 ग्रा. प्रतिदिन प्रत्येक 6–8 घण्टे में बच्चों में 15 मि.ग्रा./कि.ग्रा. प्रत्येक 4 घण्टे में	Syrup (सिरप) (125 मि.ली./5 मि.ली.) Tablet (गोली) (500 मि.ग्रा.)	2.5–2.5–2.5 मि.ली. 5–5 मि.ली.	7.5–7.5 मि.ली.	7.5–7.5 मि.ली.	x	x	1	
		Injection (इंजेक्शन)/Intravenous (IV) Intramescular (IM) (नस में/ मासपेशी में)	1/4–1/4–1/4 1/4–1/4–1/4	1/4–1/4–1/4 1/4–1/4–1/4	1/2–1/2–1/2 1/2–1/2–1/2	1/2–1/2–1/2 1/2–1/2–1/2	1/2–1/2–1/2 1/2–1/2–1/2	1–1–1 1–1–1 1–1–1	— यह दवा वयस्क व्यक्तिको 10 दिन से ज्यादा और बच्चों को 5 दिन से ज्यादा नहीं देना चाहिए।
		Capsule (कैप्स्यूल) 150 मि.ग्रा.	- मि.ली.	0.8 मि.ली.	1.3 मि.ली.	2.5 मि.ली.	3.8 मि.ली.	4.5 मि.ली.	— मरीज को बताएँ कि पेशाब, आँसू थूक और खिंखार का रंग नारंगी लाल हो जाता है, इसलिए घबराएँ नहीं ये दवा के कारण होता है। — दवा नियमित रूप से लें। — इस दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। — बिना डॉक्टरी सलाह के दवा बंद न करें।

दवाई का नाम — एमिनोफायलिन Aminophylline (खवसनी विस्तारक या ब्रॉकोडायलेटर)  
संकेत / समयावधि — 1. दमा के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दृष्टिभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में			30–44.9 कि.ग्रा.	45 +			
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.		
			0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
		Oral (मुँह द्वारा)	Tablet (गोली) 100 मि.ग्रा.	x	1/4– 1/4– 1/4	1/2– 1/2– 1/2	3/4– 3/4– 3/4			अमाशय व आंतों में जलन व एकतस्त्राव, मितली, उल्टी, चिंता, सिरदर्द, भ्रम, बैचैनी, चाककर, हृदय का धड़कन तेज होना, हाथ की कम्पन
<u>वयस्कों में</u>  100–300 मि.ग्रा. दिन में तीन बार <u>बच्चों में</u> 5 मि.ग्रा./कि. ग्रा. दिन में तीन बार		250 मि.ग्रा./ 10 मि.ली. (Loding Dose शुरुआती खुराक)	Injection (इंजेक्शन) Intraveno us (IV) (नस में)	1 मि.ली.	1.5 मि.ली.	2.5 मि.ली.	3.5 मि.ली.	5 मि.ली.	8 मि.ली.	— गम्भीर हृदय रोग, जिगर या गुर्दे के गंभीर रोग, हृदय की नाकामी, पेट के छाले जैसे मामलों में सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें।  — इस दवा की अधिक मात्रा बच्चों के लिए खतरनाक होती है। — मरीज को बताएं कि यह दवा आना चाने के बाद लें।
			250 मि.ग्रा./ 10 मि.ली. (Maintenance Dose रोजाना खुराक) प्रत्येक 6 घंटे में दें		1.5 मि.ली.	2.5 मि.ली.	3.5 मि.ली.	5 मि.ली.	8 मि.ली.	

दवाई का नाम — साल्बूटामोल Salbutamol (श्वसनी विस्तारक या ब्रोंकोडायलेटर)  
 संकेत / समयावधि — 1. दमा, ब्रोंकायटिस के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दृष्टिभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में			खुराक	दृष्टिभाव			
		3–5.9 कि.ग्र.	6–9.9 कि.ग्र.	10–14.9 कि.ग्र.	15–19.9 कि.ग्र.	20–29.9 कि.ग्र.	30–44.9 कि.ग्र.	45 +		
	0–6 माह	6 माह–1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष से	14 वर्ष से ज्यादा			
	Syrup (सिरप) 2 मि.ग्र./5 मि.ली.	1.5–1.5–2.5 (मि.ली.)	2.5–2.5–2.5 (मि.ली.)	5–5–5 (मि.ली.)	5–5–5 (मि.ली.)	x	x			- गर्भवरक्षण में और दवा के प्रति अति-संवेदनशील मरीजों को यह दवा न दें।
	Oral (मँह द्वारा)	Tablet (गोली) 4 मि.ग्र.	x	x	1/2–1/2–1/2	1/2–1/2–1/2	1/2–1/2–1/2	1–1–1		- बुजुर्ग मरीजों में दवा की खुराक कम मात्रा में दें।
<u>वयस्कों में</u>										- दवा देने से पहले मरीज को मधुमेह, मानसिक रोग, बढ़ी हुई घड़कन का तेज होना और हृदय की धड़कन का तेज होना
<u>बच्चों में</u>										पहले मरीज की हृदय का छून की कोई बीमारी, मिर्गी के बारे में अवश्य पूछें।
4 मि.ग्र. दिन में तीन बार बच्चों में										
5 मि.ग्र./कि.ग्र. दिन में तीन बार										
	Inhalation (इन्हालेशन) (श्वास द्वारा)	5 मि.ग्र./मि.ली. (प्रत्येक 8 घंटे में दें)	0.1 मि.ली.	0.2 मि.ली.	0.3 मि.ली.	0.4 मि.ली.	0.5 मि.ली.	0.7 मि.ली.	1 मि.ली.	

दवाई का नाम — एफ्लीनालीन Adrenaline (आपातकालीन दवा या इमरजेंसी दवा)  
संकेत / समयावधि — 1. हृदय की धड़कन कम होने पर, 2. अति संवेदनशील (एलजी) के उपचार में (Anaphylaxis)

सूक्षीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष उपचार	सावधानियाँ
			वर्जन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में			30–44.9 कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.			
3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.					
0–6 माह	6 माह— 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा				
0.01 मि.ग्रा. /कि.ग्रा.	Intravenous (IV) (नस्स द्वारा)	प्रिली. 0.5 मिलाकर पानी में स्टेराइल प्रिली.	प्रिली. 0.1 मिलाकर पानी में स्टेराइल प्रिली.	प्रिली. 2 मिली.	प्रिली. 2.5 मिली.	प्रिली. 4 मिली.	प्रिली. 5 मिली.	हृदय की क्रिया में गड़बड़ी, हृदय संबंधी बीमारियाँ, उच्च एकत्राया प वाले रोगियों को यह दवा न दें। — मधुमेह (शावकर की बीमारी) वाले मरीज, यकृत व जुर्दे से संबंधित बीमारियाँ, हृदय की उच्च धड़कन का बढ़ जाना, सिरदर्द, औंखों से पानी आना, थकावट, मिली, उल्टी, झुंगला दिखना, सीने में दर्द, मुँह सुखना	— हृदय की क्रिया में गड़बड़ी, हृदय संबंधी बीमारियाँ, उच्च एकत्राया प वाले रोगियों को यह दवा न दें। — मधुमेह (शावकर की बीमारी) वाले मरीज, यकृत व जुर्दे से संबंधित बीमारियाँ, हृदय की उच्च धड़कन वाले मरीजों में व बुजुर्गों को सावधानीपूर्वक दवा दें। — गर्भवत्था व रस्तनपान के दोरान डॉक्टरी सलाह से ही यह दवा लें। — दवा देने से पहले मरीज का बी.पी. और नाड़ी अवश्य जाँचें। — मरीज को बताएं कि दवा लेने के दोरान चाय अधिक मात्रा में न लें।	

दवाई का नाम — एट्रोपीन Atropine (आपातकालीन दवाई)

संकेत / समयावधि — 1. कीटनाशक / विष के लिए, 2. हृदय रोग के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध कृप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3—5.9 कि.ग्र.	6—9.9 कि.ग्र.	10—14.9 कि.ग्र.	15—19.9 कि.ग्र.	20—29.9 कि.ग्र.	30—44.9 कि.ग्र.	45 +	
			0—6 माह	6 माह— 1 वर्ष	1—3 वर्ष	4—6 वर्ष	6—10 वर्ष	11—14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
वयस्कों में	Injection (इंजेक्शन) Intravenous s (IV) / Intramusc ular (IM) (मासपेशी में /नस में )	0.6 से 1 मि.ग्र.  बच्चों में 0.02 मि.ग्र. /कि.ग्र.	0.1  /मि.ली.	0.2  मि.ली.	0.3  मि.ली.	0.4  मि.ली.	0.6  मि.ली.	0.8  मि.ली.	1  मि.ली.	— ऐसे मरीज जिन्हें जिगर या गुर्दे की समस्या हो, उच्च एकत्राप की बीमारी हो, पेशाब में तकलीफ हो तो उन्हें यह दवा न दें।
										— हृदय रोगी मरीजों को डॉक्टरी सलाह लेकर ही यह दवा दें।

- दवाई का नाम — हाइड्रोकॉर्टिसोन Hydrocortisone (आपातकालीन दवाई)
- संकेत / समयावधि — 1. हार्मोन की कमी की पूर्ति हेतु, 2. त्वचा की विभिन्न गडबडियों के उपचार में, 3. चुनी हुई गंभीर अवस्था में (जैसे कि गंभीर अस्थमा, सर्पदंश के उपचार के लिये क्षण में)

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
			3—5.9 कि.ग्रा.	6—9.9 कि.ग्रा.	10—14.9 कि.ग्रा.	15—19.9 कि.ग्रा.	20—29.9 कि.ग्रा.	30—44.9 कि.ग्रा.	45 +	
			0—6 माह	6 माह— 1 वर्ष	1—3 वर्ष	4—6 वर्ष	6—10 वर्ष	11—14 वर्ष	14 वर्ष से	
<u>वयस्क</u> 100—200 मि. ग्रा. प्रतिदिन प्रत्येक 12 घण्टे में <u>बच्चों में</u>	Injection (इंजेक्शन) Intravenous (IV) / Intramuscul ar (IM) (नस में/मांसपेशी में)	100 मि.ग्रा. वायल को 1. 6 मि.ली. स्टेरायल पानी में घोल बनाएँ (100 मि.ग्रा./2 मि.ली.)	0.3 मि.ली.	0.4 मि.ली.	0.7 मि.ली.	1 मि.ली.	1.3 मि.ली.	2 मि.ली.	2 मि.ली.	अपच, मुहासे, वजन बढ़ना, बच्चों की वृद्धि को धीमा कर सकती है, मुर्मुरी हाइड्रोज़ी,
1—5 मि.ग्रा. /कि.ग्रा. प्रतिदिन दो बराबर खुराक में बांटकर दें	Topical Application (मलहम)	0.5%	इस दवा को प्रभावित क्षेत्र में एक पतली परत के हिसाब से दिन में 2 से 4 बार लगाएँ						उच्च रक्ताचाप रोधी दवाईयों के असर को कम करती है।	

दवाई का नाम – लिकिंड पैराफिन Liquide Paraffin (कब्जारोधी या लेक्स्ट्रीव)  
 संकेत / समयावधि – 1. कब्ज के उपचार में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वर्जन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में			30–44.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.		
			3–5.9 कि.ग्रा.	6–9.9 कि.ग्रा.	10–14.9 कि.ग्रा.	15–19.9 कि.ग्रा.	20–29.9 कि.ग्रा.	30–44.9 कि.ग्रा.	45 +	
<u>वयस्क</u>	10–15 मि.ली. रात में सोने के पहले एक बार	Oral (मुँह द्वारा)	0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	<ul style="list-style-type: none"> <li>इस दवा को मितली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द वालों को न दें।</li> </ul>
<u>बच्चों में</u> (3 वर्ष से उपर) 5–10 मि.ली. रात में सोने से पहले एक बार	100 मि.ली. का सासपेन्शन		x	x	x	5 मि.ली.	8 मि.ली.	10 मि.ली.	<ul style="list-style-type: none"> <li>पेट दर्द, मितली</li> <li>गर्भावस्था और स्तनपान के दोरान यह दवा ड़ोकटरी सलाह से ही दें।</li> </ul>	

- दवाई का नाम – मिसोप्रोस्टॉल Misoprostol (मातृ स्वास्थ्य से संबंधित दवाएँ या मेट्रनल हेल्थ थेरेपी)  
 संकेत / समयावधि – 1. प्रसव के बाद खून बढ़ने को रोकने के लिए, 2. गर्भपात के लिए

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक	विशेष ट्रूप्रभाव	सावधानियाँ
Transvaginally (योनि के अंदर)	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	गर्भपात के लिए 50 माइक्रो ग्राम ( $1/2$ गोली) योनि के अंदर डालें और 3 घण्टे के अंदर इसका पर्याप्त प्रभाव नहीं हो तो 100–300 माइक्रो ग्राम (1 से 3 गोली) प्रत्येक 3–3 घण्टे के अंतराल में डाल सकते हैं। प्रसव पश्चात् 4 गोली एक साथ दौरान न दें।	रक्तस्त्राव	– यह दवा गर्भवत्था और स्तनपान के दौरान न दें।

दवाई का नाम — कैल्शियम गोली Calcium Carbonate (खनिज)

संकेत / समयावधि — 1. कैल्शियम की कमी की पूर्ति के लिए. 2. गर्भवती महिलाओं को चौथे माह से लेकर बच्चे के पैदा होने के तीन माह तक. 3. वृद्धावस्था.

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	खुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	3—5.9 कि.ग्रा.	6—9.9 कि.ग्रा.	10—14.9 कि.ग्रा.	15—19.9 कि.ग्रा.	20—29.9 कि.ग्रा.	30—44.9 कि.ग्रा.	45 + कि.ग्रा.	सावधानियाँ
			0—6 माह	6 माह— 1 वर्ष	1—3 वर्ष	4—6 वर्ष	6—10 वर्ष	11—14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा	
<u>वयस्क</u> 500 मि.ग्रा. दिन में दो बार	<u>बच्चों में</u> (4 वर्ष से 10 वर्ष तक) 500 मि.ग्रा. दिन में दो बार	Tablet (गोली) (5 मि.ग्रा.)	x	1/2	1½	1—1	1—1	1—1	1—1	- दवा हमेशा खाने के संग दें, खाली पेट लेने से इसका असर कम होता है। - यह दवा गुदे में पथरी की समस्या वाले मरीज को न दें।
	<u>बच्चों में</u> (6 माह से 3 वर्ष तक) 250—750 मि. ग्रा. प्रतिदिन दिन में एक बार	Oral (मुँह द्वारा)								कमी—कमी पेट में गड़बड़ी
		25 मि.ग्रा./ मि.ली. एम्फूल	x	x	0.3 मि.ली.	0.4 मि.ली.	0.5 मि.ली.	0.8 मि.ली.	1 मि.ली.	

दवाई का नाम – फोलिक एसिड Folic Acid (विटामिन / खनिज)

संकेत / समयावधि – 1. खून की कमी होने पर आयरन की दवाई के साथ देते हैं. 2. सिकलसेल एनीमिया (खून का हँसियाकार होना) के उपचार में. 3. गम्भीरता में

सूक्ष्मीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	भुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3–5.9 किं.ग्रा.	6–9.9 किं.ग्रा.	10–14.9 किं.ग्रा.	15–19.9 किं.ग्रा.	20–29.9 किं.ग्रा.	30–44.9 किं.ग्रा.	45 + वर्ष		
		0–6 माह	6 माह– 1 वर्ष	1–3 वर्ष	4–6 वर्ष	6–10 वर्ष	11–14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा		
<u>वयस्तक</u>										
5 मि.ग्रा. दिन में एक बार	<u>बच्चों में</u> (1 वर्ष से ऊपर) 0.1–0.15 मि.ग्रा./किं.ग्रा. दिन में एक बार	Oral (मुँह द्वारा)  Tablet (गोली) (5 मि.ग्रा.)	x	x	1/3	1/2	1/2	1		

दवाई का नाम — डाइसाइक्लोमीन Dicyclomine (अन्य दवाई)

संकेत / समयावधि — 1. मरोड़ के साथ पेट दर्द होने पर, 2. पेचिस में, 3. माहवारी के दर्द में

सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	छुराक						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ
			वजन किलोग्राम में या अनुमानित उम्र में							
		3-5.9 कि.ग्रा.	6-9.9 कि.ग्रा.	10-14.9 कि.ग्रा.	15-19.9 कि.ग्रा.	20-29.9 कि.ग्रा.	30-44.9 कि.ग्रा.	45 + वर्ष		
		0-6 माह	6 माह— 1 वर्ष	4-6 वर्ष	6-10 वर्ष	11-14 वर्ष	14 वर्ष से ज्यादा			
		Syrup (सिरप) 10 मि.ग्रा. / 5 मि. ली.	x	2-2-2 मि.ली.	3-3-3 मि.ली.	x	x	x		- गर्भवती व स्तनपान के दौरान एवं 6 माह से छोटे बच्चों
		Capsule (कैप्सूल) 10 मि.ग्रा.	x	x	x	x	x	x		
		Oral (मुँह द्वारा)	x	x	x	1-1-1	1-1-1	2-2-2	2-2-2	मुँह सूखना, कठज़, थकावट, प्रकाश देखने में परेशानी, पसीने का कम निकलना, मितली, उल्टी, भ्रम
		Tablet (गोली) 20 मि.ग्रा.	x	x	1/4- 1/4- 1/4	1/2- 1/2- 1/2	1/2- 1/2- 1/2	1-1-1	1-1-1	
		Injection (इंजेक्शन)								
		Intramuscular (IM) / (मांसपेशी में) प्रतिदिन प्रत्येक 8 घंटे में	20 मि.ग्रा. / 2 मि. ली. एप्स्टुल	0.5 मि.ली.	0.7 मि.ली.	1 मि.ली.	2 मि.ली.	2 मि.ली.	2 मि.ली.	

### Amoxicillin (प्रतिजेविक या एन्टीबॉयोटिक)

नाक, कान, गले एवं श्वसन मार्ग के संक्रमण में

		खुराक वजन इन Kg या अनुमानित उम्र में						विशेष दुष्प्रभाव		सावधानियाँ
सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	3-5.9 kg	6-9.9 kg	10-14.9 kg	15-19.9 kg	20-29.9 kg	30-44.9 kg	44+	यदि रोगी को दवा से ऐलर्जी है, तो इसे डॉक्टर से उचित जांच और निदान के बाद ही दिया जाना चाहिए।
वयस्कों में 50-500Mg दिन में 3 बार देना है तथा बच्चों में 20-40 Mg दिन में 3 बार देना है।	Oral (मुँह द्वारा)	Tablet 250 Mg पानी में घुलने वाली गोली	1/2-1/2	1-1	1 ½ -1 ½	1-1-1	1-1-1	X	X	उल्टी-दर्स्त, अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया, उट्टिकेरिया, एंजियोएडिमा, एनाफिलोकिसस प्रतिक्रिया
		Capsule 500 Mg		X	X	X	X	1-1-1	1-1-1	

दवाई का नाम – हिड्रोक्सी यूरिया hydroxyurea (अन्य दवा)  
 संकेत / समयावधि – 1. एच.आई.वी. संक्रमण के उपचार में, 2. सिकलसेल एनिया के उपचार के केंसर के उपचार में

			खुराक वजन इन Kg या अनुमानित उम्र में						विशेष दुष्प्रभाव	सावधानियाँ	
सूत्रीकरण	दवाई देने का मार्ग	उपलब्ध रूप	3-5.9 kg	6-9.9 kg	10-14.9 kg	15-19.9 kg	20-29.9 kg	30- 44.9 kg	44+		
वयस्क में पहले दिन 500 mg प्रतिदिन दो बराबर खुराक में बाटकर	Oral (मुँह द्वारा)	कैप्सूल (500 मि.ग्रा)	X	X	X	X	X	11-14 वर्ष वर्ष	14 वर्ष से अधिक	कभी कभी उलटी, भूख न लान, छून की कभी, बाल झाड़ना	यह दवा गम्भीरता में न दें से – इद दावा को जिगर या गुर्दे सम्बंधित बिमरियों वाले मरीज को सावधानीपूर्वक दें स
		Tablet कैप्सूल (गोली 1000 मिग्रा.)						1/4	1/2	1/2 -1/2	

दवाई का नाम – सिल्वर सलफाडायजीन Silver Sulfadiazine (अन्य दावा )

संकेत / समयावधि – 1. जलने, काटने, चिलने और करंट लगने पर, 2. गरम पानी से फकोले होने पर

		खुराक वजन इन Kg या अनुमानित उम्र में						विशेष दुष्प्रभाव		सावधानियाँ	
दवाई देने का मार्ग	उपलक्ष रूप	3-5.9 kg	6-9.9 kg	10-14.9 kg	15-19.9 kg	20-29.9 kg	30-44.9 kg	44+	कभी कभार घाव में पथ्यन्द सक्रमण हो सकता है, दव चालू रखें और डायटर को सुचित करें से पहले डॉक्टर र की सलाह लें।	– संक्रमण की आशंका समाप्त हो जाने तक उपचार जरी रखें – गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान तथा शिशु एवं बच्चों के लिए दवा लगाने से पहले डॉक्टर र की सलाह लें।	
Topical (मलहम)	300 Mg/ 3 ML	3-5.9 kg	6-9.9 kg	10-14.9 kg	15-19.9 kg	20-29.9 kg	30-44.9 kg	44+	कभी कभार घाव में पथ्यन्द सक्रमण हो सकता है, दव चालू रखें और डायटर को सुचित करें से पहले डॉक्टर र की सलाह लें।	– संक्रमण की आशंका समाप्त हो जाने तक उपचार जरी रखें – गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान तथा शिशु एवं बच्चों के लिए दवा लगाने से पहले डॉक्टर र की सलाह लें।	
5 %	प्रतिदिन 1 प्रतिशत क्रीम की 3-4 mm मोती परत दिन में दो बार लगायें।										